

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8 ผู้ป่วยทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย

กลุ่มปัญหา สุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
<p>New born (เป้าหมาย : ทารกแรกเกิด น้ำหนักตัวน้อย)</p>	<p>ทารกแรกเกิด ที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม (Low birth weight : LBW) และไม่มีโรคร่วม เช่น โรคหัวใจแต่กำเนิด กลุ่มอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ปากแหว่งเพดานโหว่</p>	<p>ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม ทุกรายและได้รับการส่งกลับดูแลต่อเนื่อง</p>	<p>ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หลังได้รับการดูแลต่อเนื่องจากเตียง 3 แล้ว มี น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ(ตาม เกณฑ์อายุ)</p>	<p>ทารกแรกเกิดที่มีน้อยกว่า 2,500 กรัม หลังจากได้รับการดูแลต่อเนื่องจากเตียง 2 แล้ว มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติ และมีพัฒนาการตามวัย</p>
		<p>แนวทางการดูแล เยี่ยมครั้งแรกภายในสัปดาห์แรกหลังจำหน่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประเมินน้ำหนัก 2.ประเมินการดูดกลืน 3.ประเมินปริมาณนมที่ได้รับ 4.ประเมินการขับถ่าย 5.ประเมินพัฒนาการเจริญเติบโต 6.ประเมินการติดเชื้อ <p>เยี่ยมครั้งที่ 2 ภายใน สัปดาห์ที่ 2 หลังจำหน่าย ประเมินตามข้อ 1-6 ข้อ</p> <p>เยี่ยมครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 4 ประเมินตามข้อ 1-6 ข้อ</p>	<p>แนวทางการดูแล กรณีจำหน่ายจาก รพ.</p> <p>เยี่ยมครั้งแรก ภายใน 2 สัปดาห์ ประเมินน้ำหนัก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประเมินปริมาณนมที่ได้รับ 2.ประเมินการขับถ่าย 3.ประเมินพัฒนาการเจริญเติบโต <p>กรณีปรับเตียง จาก 3 เป็น 2 เยี่ยมต่อจากครั้ง สุดท้ายของเตียง 3 อีก 2 สัปดาห์ (หรือสัปดาห์ที่ 6 ของเตียง 3)</p> <p>เยี่ยมครั้งที่ 2 หลังการเยี่ยมครั้งแรก 1 เดือน</p>	<p>แนวทางการดูแล กรณีจำหน่ายออกจาก รพ.เยี่ยมครั้งแรก ภายใน 4 สัปดาห์</p> <p>กรณีปรับจากเตียง 2 เป็นเตียง 1 เยี่ยม ภายใน 1 เดือน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ประเมินพัฒนาการและการเจริญเติบโต 2.ประเมินการได้รับวัคซีน
		<p>แนวทางการปรับประเภทเตียง 3 เป็น 2 หลังได้รับการดูแลต่อเนื่อง มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แต่ ยังน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ เลื่อนเป็นเตียง 2</p>	<p>แนวทางการปรับประเภทเตียง 2เป็น 1 มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติและมี พัฒนาการตามวัย เลื่อนเป็นเตียง 1</p>	<p>แนวทางการปรับประเภทเตียง 1 เป็น สุขภาพเด็กดี มีพัฒนาการและการเจริญเติบโตตามวัย และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์</p>

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke

กลุ่มปัญหา สุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
โรคหลอดเลือด สมอง (Stroke)	หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีภาวะการตีบ ตัน หรือแตก ของหลอดเลือดในสมอง ทำให้มีความผิดปกติของการรับรู้ ความจำ สติปัญญา การเคลื่อนไหว การพูด และการกลืน	ผู้ป่วย stroke ที่มีความผิดปกติมากถึงผิดปกติอย่างรุนแรง สามารถเดินได้แต่ต้องช่วยพยุง ต้องมีคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันหรือ ต้องนอนบนเตียง ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด (Modified Ranking scale= 4-5 คะแนน , moterpower gr. 0-3)	ผู้ป่วย stroke ที่มีความผิดปกติพอควร ต้องการคนอื่นช่วยในการทำกิจวัตรประจำวันบางอย่าง แต่สามารถเดินได้โดยไม่มีคนช่วย (Modified Ranking scale = 3 คะแนน, moterpower gr. 3-4)	ผู้ป่วย stroke ที่มีความผิดปกติที่ไม่รุนแรง หรือมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ (Modified Ranking scale= 0-2 คะแนน, moterpower gr. 4-5)
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

ผู้ป่วย โรคโรคหัวใจ STEMI

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
โรคหัวใจ STEMI	ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดคลื่นหัวใจไฟฟ้า ส่วน ST ยกสูงขึ้น (ST Elevated)	ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาอาการจนพ้นระยะวิกฤตแล้ว หลังการจำหน่ายกลับบ้านในระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก	ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาอาการจนพ้นระยะวิกฤตแล้ว หลังการจำหน่ายกลับบ้านในระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก	ผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการรักษาอาการจนพ้นระยะวิกฤตแล้ว หลังการจำหน่ายกลับบ้านในระยะเวลา 12 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยไม่มีอาการเจ็บหน้าอก
		แนวทางการดูแล ได้รับการดูแลจากทีมงานสหสาขาวิชาชีพประเมินซ้ำภาวะ acute MI มีการติดตามเยี่ยมของทีมสหสาขา และทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รพ.สต./ศสม. ภายใน 1 เดือน	แนวทางการดูแล ทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รพ.สต./ศสม. ติดตามประเมินอาการซ้ำทุก 2 เดือน	แนวทางการดูแล ทีมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รพ.สต./ศสม. ติดตามประเมินอาการซ้ำทุก 3 เดือน และผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บหน้าอกตลอดระยะเวลาที่ได้รับการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย Head injury

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (Head injury)	ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากแรงที่เข้ามากระทบต่อหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะและเนื้อเยื่อที่เป็นส่วนประกอบภายในกะโหลกศีรษะ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอาการทางระบบประสาทสมอง (neuro signs)	ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะระดับรุนแรง GCS \leq 8 คะแนน ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องการผู้ดูแล ช่วยเหลือในการทำกิจกรรมทุกอย่าง	ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลาง GCS = 9-12 คะแนน ช่วยตัวเองได้บางส่วน และอาจมีอาการรบกวนที่ทำให้ต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการทำกิจกรรมบางอย่าง หรือเป็นบางครั้ง เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือสับสน หรือมีการบาดเจ็บอวัยวะอื่นที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย GCS = 13 - 15 คะแนน สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี หรือต้องการพึ่งพาผู้อื่นเล็กน้อย
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย โรค Spinal cord injury

กลุ่มปัญหา สุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
โรค Spinal cord injury	<p>กลุ่มอาการของผู้ป่วยที่มีการสูญเสียหน้าที่ของไขสันหลัง (Neuro logical deficit) ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากอุบัติเหตุ หรือการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ภาวะติดเชื้อโรคมะเร็ง จนทำให้ผู้ป่วยมีภาวะอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) และอัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia) และแพทย์วินิจฉัยว่ามีภาวะอัมพาต</p>	<p>ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพาตทั้งตัว (Quadriplegia) ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันทุกอย่าง</p>	<p>ผู้ป่วยที่มีภาวะอัมพาตครึ่งท่อน (Paraplegia) ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน และพึ่งพาผู้ดูแลบางกิจกรรม</p>	ไม่มี
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย โรคไต ESRD on CAPD

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
โรคไต ESRD on CAPD (end stage renal disease)	ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง	ผู้ป่วย ESRD on CAPD ที่มีข้อจำกัดในการดูแลกิจวัตรประจำวัน ทำให้ช่วยตัวเองได้น้อยหรือไม่ได้ เช่น อาจมีโรคหรือภาวะความพิการอื่นร่วม หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง จำเป็นต้องอาศัยผู้อื่นในการทำกิจกรรมให้เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด	ผู้ป่วย ESRD on CAPD ที่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้หรือได้ไม่เต็มที่ ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยบางกิจกรรม อาจมีหรือไม่มีอาการแทรกซ้อน แต่เป็นอาการแทรกซ้อนที่ไม่รุนแรง	ผู้ป่วย ESRD on CAPD ที่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ และต้องการพึ่งพาผู้อื่นน้อยหรือไม่ต้องการ ไม่มีอาการแทรกซ้อน หรือความผิดปกติ
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย โรคเบาหวาน

กลุ่มปัญหา สุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
โรคเบาหวาน	หมายถึง ผู้ป่วยที่มีระดับน้ำตาล ดังนี้ 1. Fasting plasma glucose > 126 mg/dl 2. Oral glucose Tolerance > 200 mg/dl 3. 2 ชั่วโมง plasma glucose > 200mg/dl ซึ่งจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็น โรคเบาหวาน และขึ้นทะเบียนในการรักษาเป็นผู้ป่วย DM	ผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนและมีอาการของ โรครุนแรง ไม่สามารถประกอบ กิจกรรมประจำวันได้ด้วยตัวเอง จำเป็นต้องมีผู้ดูแลในการทำ กิจกรรมให้เป็นส่วนใหญ่หรือ ทั้งหมด	ผู้ป่วยเบาหวานที่มี ภาวะแทรกซ้อนหรือมีอาการ เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดอันตราย ได้และช่วยเหลือตัวเองได้บาง กิจกรรม และอาศัยผู้อื่นช่วย บางส่วน เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีแผลที่เท้า หรือ ผู้ป่วย เบาหวานที่ต้องฉีดยาInsulin หรือผู้ป่วยขาดนัด	ผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถประกอบ กิจกรรมประจำวันได้ตามปกติ และ ต้องการพึ่งพาผู้อื่นน้อยหรือไม่ ต้องการ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน หรือ มีภาวะแทรกซ้อนแต่ไม่มีผลกระทบ กับวิถีชีวิตขาดความเข้าใจในการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและมา ตรวจตามนัดทุกครั้ง
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูง

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
โรคความดันโลหิตสูง	หมายถึง ผู้ที่มีความดันเลือดเท่ากับหรือสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และขึ้นทะเบียนในการรักษาเป็นผู้ป่วย HT	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงระดับอันตราย หรือระดับความดันโลหิต $\geq 160/110$ mmHg และได้รับการรับตัวเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลเพื่อลดระดับความดันโลหิต จนพ้นระยะวิกฤติ และหลังจำหน่ายกลับบ้านในระยะ 2 สัปดาห์แรก	ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงระดับปานกลาง มีระดับความดันโลหิต ไม่เกิน 160/100 mmHg หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคไต วายเร็วรั้งระยะที่ 3 สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้บางกิจกรรม หรือต้องการพึ่งพาผู้อื่นช่วยบางส่วน	ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเล็กน้อย ระดับความดันโลหิต ไม่เกิน 140/90 mmHg ที่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันได้เอง ต้องการพึ่งพาผู้อื่นน้อยหรือไม่ต้องการ ไม่มีอาการแทรกซ้อนหรือความผิดปกติ และรับประทานยาตามแผนการรักษาอย่างต่อเนื่อง
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล จำกัดการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เช่น ให้พักอยู่กับที่ ให้นอนอยู่บนเตียง มีผู้ดูแลช่วยเหลือในการจัดหาอาหาร พาเข้าห้องน้ำ	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย Palliative care

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
<p>ผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบ ระดับประคองPalliative care</p>	<p>ผู้ป่วยระยะสุดท้าย หมายถึง ผู้ป่วยทุก กลุ่มโรค ที่มีอาการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย หรือระยะใกล้ตาย อาจเป็นระยะ ประมาณ 1 สัปดาห์ หรือระยะเวลาไม่ เกิน 6 เดือน ซึ่งต้องการการดูแล ครอบคลุม 4 มิติ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เพื่อบรรเทา ความทุกข์ทรมาน ได้รับการจัดการ อาการรบกวนที่มี ทำให้ผู้ป่วยและ ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการ เยียวยาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ จากโลกนี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรี</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> เป็นประเภทเตียง palliative ไม่มีการจำแนกเป็นเตียง 1,2,3 </div>		
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วย โรคผู้สูงอายุ

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
ผู้สูงอายุ	ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีสัญชาติไทย	ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง (bed bound elder) เช่น ผู้สูงอายุแก่หง่อม หรือมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง มีความเสื่อมทางกายภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่น เป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด Barthel's Index ADL ≤ 8	ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังที่ควบคุมไม่ได้หรือมีภาวะแทรกซ้อน มีภาวะหลงลืม หรือความจำเสื่อม (senile dementia) อาจมีภาวะซึมเศร้า ทำให้ช่วยเหลือตนเองได้ บางกิจกรรม และเริ่มพึ่งพาผู้อื่นในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ Barthel's Index ADL 9-11 คะแนน	ผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลัดตกหกล้ม หรือมีโรคเรื้อรังร่วมด้วย 1-2 โรค แต่สามารถควบคุมได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดี และทำกิจวัตรประจำวันได้อย่างต่อเนื่อง Barthel's Index ADL 12-20 คะแนน
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

ผู้ป่วยจิตเวช

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
จิตเวช	ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านความคิดและพฤติกรรม ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวช เช่น โรคจิตเภท โรคจิตซึมเศร้า โรคจิตจากการใช้สารเสพติด	ผู้ป่วยจิตเวช ที่ขาดยา มีอาการทางจิตชัดเจน เช่น พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ก้าวร้าว ก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น หรือมีภาวะซึมเศร้า เสี่ยงต่อการทำร้ายตนเอง ไม่สนใจดูแลตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน	ผู้ป่วยจิตเวช ที่เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น ไม่นอน พุดบ่นคนเดียว หูแว่ว แยกตัว เริ่มไม่สนใจในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ไม่ร่วมกิจกรรมของครอบครัว และขาดยา	ผู้ป่วยจิตเวชที่อาการทางจิตสงบ รับประทานยาต่อเนื่อง ไม่ขาดนัด สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ในการประกอบอาชีพได้ตามปกติ
		แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง

คำนิยาม/การจำแนกประเภทเตียง/แนวทางการดูแล/แนวทางการปรับประเภทเตียง Long term care เครือข่ายบริการที่ 8

คนพิการ

กลุ่มปัญหาสุขภาพ	คำนิยาม	เตียง 3	เตียง 2	เตียง 1
คนพิการ	ผู้ที่ได้รับการประเมินความพิการและวินิจฉัยโดยแพทย์ ว่าเป็นผู้พิการในกลุ่ม 8 ประเภท	ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ต้องการพึ่งพาผู้อื่นทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด Barthel's Index ADL \leq 8	ผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด ต้องการพึ่งพาผู้อื่นบางส่วน Barthel's Index ADL 9-11 คะแนน	ผู้พิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด ต้องการพึ่งพาผู้อื่นเล็กน้อย Barthel's Index ADL 12-20 คะแนน
		แนวทางการดูแล :	แนวทางการดูแล	แนวทางการดูแล
		แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง	แนวทางการปรับประเภทเตียง