 โรงพยาบาลนครพนม	
ระดับเอกสาร : ระเบียบปฏิบัติ (System Procedure) เลขที่ : IC-CPG-016-00	ฉบับที่ : 1
เรื่อง : การป้องกันการติดเชื้อดื้อยา	วันที่ : 15 ก.พ., 2564
หน่วยงาน : กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ	แผนกที่เกี่ยวข้อง : ทุกแผนก
ผู้จัดทำ : (นางชวีวัฒนา ชาระ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ผู้อนุมัติ : (นายสมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม
ผู้ทบทวน : (นายณรงค์เดช บุตรวรร) ตำแหน่ง นายแพทย์ชำนาญการ	


1. วัตถุประสงค์ : เพื่อลดการติดเชื้อดื้อยา
2. ขอบข่าย : บุคลากรในโรงพยาบาลนครพนม
3. คำจำกัดความ : -
4. เอกสารอ้างอิง :
 - 4.1 คู่มือการวินิจฉัยการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,2561
 - 4.2 คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ,2560
5. รายละเอียด :
6. ภาคผนวก : -

เอกสารควบคุม

Flow การแยกและการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา

แผนกผู้ป่วยใน

1. *Pseudomonas aeruginosa* ที่ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenem และหรือยา colistin
2. *Acinetobacter baumannii* ที่ ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenem และหรือยา colistin
3. *Stenotrophomonas maltophilia* ที่ดื้อต่อยา co-trimazole และ levofloxacin
4. *Enterobacteriaceae* เช่น *Escherichia coli* , *Klebsiella pneumoniae* ที่ดื้อต่อยากลุ่ม carbapenem, imipenem, meropenem หรือ doripenem เชื้อเหล่านี้เรียกรวมกลุ่มว่า carbapenem resistant *Enterobacteriaceae* (CRE) เป็นเชื้อที่เป็นปัญหาทั่วโลกและในประเทศไทย รวมทั้งเขต 8 ด้วย
5. VISA (*Vancomycin - intermediate Staphylococcus aureus*)
6. VRSA (*Vancomycin - resistant Staphylococcus aureus*)



เอกสารควบคุม

* แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา

- แยกอุปกรณ์ของใช้ (หุฟัง เครื่องวัดความดัน ปรอทวักซ์)
- ติดป้าย (Contact precautions) หน้าเวรระเบียบ
- ติดป้าย (Contact precautions) หน้าเตียง - ติดตั้ง แอลกอฮอล์เจลทุกเตียง
- ใช้มาตรการป้องกันแพร่กระจายเชื้อทางการสัมผัส (ถุงมือ - เอี่ยมพลาสติกแขนยาว) ล้างมือก่อน ก่อนดูแลผู้ป่วยใส่ทุกรายเมื่อต้องสัมผัสผู้ป่วย
- ล้างมือ ด้วย แอลกอฮอล์เจล , หรือ ล้างด้วยน้ำกับ 4% คลอโรเซกซิดีน (Chlorhexidine)
- เช็ดตัวผู้ป่วยด้วย 2% Chlorhexidine
- เสื้อผ้า ผ้าปู หมอกหมอน ผ้าห่ม แยกเป็นผ้าติดเชื้อ
- เช็ดเตียงหลังจำหน่ายด้วย 0.5% Sodium hypochlorite ผ้าเช็ดเตียงส่งซักแยกผ้าติดเชื้อ
- หมอนนอนหลังเท-ล้าง เช็ดด้วย 0.5% Sodium hypochlorite
- ส้วม เช็ดล้างด้วย 0.5% Sodium hypochlorite
- ตู้พื้น วันละ 3 ครั้ง ด้วย 0.5% Sodium hypochlorite ผ้าตู้พื้น - ถอดออกทันทีใส่ถังส่งซัก
- จัดเตรียมของใช้แอลกอฮอล์เจล, ถุงมือ, เอี่ยมพลาสติกแขนยาว ให้พร้อมใช้
- วางถังขยะติดเชื้อ ถังผ้าติดเชื้อ ถังใส่เครื่องมือเป็นเบื่อน
- บิอกอาหารใส่กล่องใช้แล้วทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ
- การถอดชุด ใช้มือจับบริเวณหน้าอกกระดูกเอี่ยมให้ที่คล้องคอขาดออก
- การถอดชุด ใช้มือจับบริเวณหน้าอกกระดูกเอี่ยมให้ที่คล้องคอขาดออก
- แล้วถอดแขนมันเข้า - จับด้านในถอดถุงมือออก - แล้วทิ้งขยะติดเชื้อ